DESTINATARI

20
NEUROLOGI TUTTE
LE SPECIALIZZAZIONI

FACULTY

Yerma Bartolini
Chiara Bomprezzi
Marco Currò Dossi
Elisa Fallica
Chiara Leta
Carlotta Stipa
Beatrice Viti

RESPONSABILI
SCIENTIFICI

Anna Rita Guidi
Daniela Passarelli

CREDITI ECM

7.8

Segreteria
Organizzativa

EOLO GROUP
EVENTI

Eolo Group Eventi srl
Via Vittorio Veneto 11
35043 Monselice (PD)

tel. 0429 767 381
cell. 392 697 9059
info@eolocongressi.it

ISCRIZIONE
gratuita online
www.eolocongressi.it

Con il contributo
incondizionato di

Eisai

LA GESTIONE FARMACOLOGICA DEL PAZIENTE CON EPILESSIA: EARLY ADD-ON



29
novembre
2019

Sala AVIS
Ospedale per gli Infermi

Viale Stradone, 9
FAENZA (RA)

In un paziente con epilessia all'esordio la prima terapia farmacologica viene scelta, generalmente, in relazione alle caratteristiche del paziente quali l'età, il sesso, le abitudini di vita, la tollerabilità del farmaco e in base a considerazioni riguardanti il tipo di epilessia.
Diversi, invece, sono i criteri che guidano la scelta di un farmaco antiepilettico in add-on in caso di mancato controllo delle crisi in un paziente in monoterapia.
L'indicazione principale è l'utilizzo di un farmaco con un meccanismo d'azione differente da quello in atto, anche se, rivestono analoga importanza: l'inquadramento sindromico dell'epilessia; la sua gravità, determinata dalla presenza e persistenza di manifestazioni convulsive generalizzate e/o di crisi con caduta; la frequenza delle crisi; la presenza di co-patologie e l'utilizzo di altri farmaci.

Tuttavia, un terzo dei pazienti con epilessia rimane refrattario alla terapia anticomiziale.
In ragione di queste considerazioni, i nuovi antiepilettici sono sempre più usati, anche se non è ancora chiaro quanto precocemente nel corso dell'epilessia debbano essere utilizzati.
La terza generazione di AEDs potrebbe avere migliore tollerabilità, eventi avversi moderati, minori interazioni farmacologiche e migliore caratteristiche farmaco cinetiche in confronto agli AEDs convenzionali.
Per queste ragioni, i farmaci anti epilettici di terza generazione, dovrebbero essere utilizzati sempre più precocemente nei pazienti epilettici.
Scopo di questo incontro è il confronto tra professionisti e la discussione sulle scelte operate nell'instaurare precocemente un trattamento in add-on in pazienti con epilessia non controllata da una monoterapia antiepilettica.

Razionale

29 *novembre*

Sala AVIS
Ospedale per gli Infermi
Faenza (RA)

LA GESTIONE FARMACOLOGICA DEL PAZIENTE CON EPILESSIA: EARLY ADD-ON

13.30
Registrazione partecipanti

13.45
Introduzione e presentazione degli obiettivi del corso
E. Fallica

15.00
Tavola Rotonda
Presentazione di casi clinici
C. Leta, B. Viti, Y. Bartolini
Discussants: **E. Fallica, M. Currò Dossi**

16.30
Epilessia sintomatica di lesione neoplastica: l'utilizzo dell'antagonista selettivo del recettore AMPA
Casi Clinici
C. Bomprezzi, D. Passarelli
Discussants: **C. Bomprezzi, A. R. Guidi**

17.45
Coffee break

18.00
Esperienza d'uso con Perampanel nelle epilessie generalizzate idiopatiche
Discussants: **A. R. Guidi, C. Leta**

19.00
"A proposito di epilessia miocloniche" quale terapia?
C. Stipa

20.00
Chiusura lavori
Compilazione questionario ECM